

# 肩こり、腰痛、関節痛

↓ここからあけてください

水性  
タイプ

開封口

やさしいはり薬です。

# 肩こり、腰痛 関節痛に

消炎鎮痛剤

第3類医薬品

## コリシートホット

はりやすい

片手で貼れる  
プラスターサイズ

8枚入

微香性でソフトな貼り心地



消炎鎮痛剤

8枚入

配置期限

ロット番号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 940794 462515

⚠ 使用上の注意

**ⓧ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

**■ 相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果 打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労  
用法及び用量 1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

**〈用法及び用量に関連する注意〉**

- (1)用法及び用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4)粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。(5)打撲、捻挫には、はれがひいてから使用してください。(6)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(7)本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。(8)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。(9)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(10)貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがしてから入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(11)皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて使用しないでください。

成分及び分量 膏体100g中

l-メントール	0.300g	オウバク軟エキス	0.330g
サリチル酸グリコール	1.000g	(原生薬換算量)	1.089g
トコフェロール酢酸エステル	0.300g	トウガラシエキス	0.040g
ジフェニヒドラミン塩酸塩	0.200g	(原生薬換算量)	2.000g

添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシニルポリマー、アクリル酸メチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンポリエーテル、ポリソルベート80、亜硫酸水素ナトリウム、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタン、赤色3号を含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かないところに保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。(5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話：076-479-1313  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋番等173

5.3cm×7.9cm 8枚入  
¥500+税



肩こり、腰痛、関節痛

コリシートホット

第3類医薬品