

外用鎮痛消炎薬 温丸膏

こりや痛みの部分にピンポイントで貼れる温感プラスターです。
 ノニル酸ワニルアミドによる温感刺激とビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)のダブル効果で患部の血行を促進します。
 サリチル酸グリコールと*l*-メントールの消炎効果で患部の痛みを早く取り除きます。
 シートにスリットが入っておりますので伸縮部分にもピッタリフィットします。また、汗も逃がし易くなっております。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

Ⓜ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法及び用量】

1日1～2回ライナーをはがし、患部にはってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。

- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。

【成分及び分量】 1.0mi中

l-メントール……………4.5g サリチル酸グリコール……………8.0g
 トコフェロール酢酸エステル……………0.5g ノニル酸ワニルアミド……………0.04g
 添加物：ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸Ca、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ゴムラテックス、赤色405号

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は未使用分をアルミ袋に入れチャックを閉め外箱に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先
 大協薬品工業株式会社
 お客様相談窓口 電話 076-479-1313
 受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)
 製造販売元 大協薬品工業株式会社
 富山市水橋島 173

