


第3類医薬品 (外用鎮痛消炎薬)

ノーリツクールハップ

使用に際しては、この説明文を必ずお読みください。必要なときに読めるように、大切に保管してください。



はがしぐちテープを取り除いて貼ってください。



配置期限 製造番号



PE,金属

128411
TKYJ803

! 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜など。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください/薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

成分・分量 膏体 100g中

dl-カンフル.....0.200g
 l-メントール.....0.300g
 サリチル酸グリコール.....1.000g
 トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE).....0.300g
 添加物：D-ソルビトール、グリセリン、ポリ
 アクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、
 CMC-Na、酸化チタン、カルボキシビニル
 ポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、
 ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、
 オレイン酸ソルビタン、香料

副作用被害救済制度
0120-149-931

8枚入(11.8cm×7.5cm) 1,200円(税別)

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法・用量

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。
- (4)粘着テープなどでかぶれやすい人は使用しないでください。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後は袋のチャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (5)期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

常盤薬品工業株式会社
 神戸市中央区港島中町6-13-1
 NOEVIR GROUP

お問い合わせは
 常盤薬品工業株式会社
 お客様相談室0120-875-710まで
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製 造 大協薬品工業株式会社
 販 売 元 富山市水橋畠等173