

第3類医薬品

こりと痛みに



ビタミンE配合

アサヒパス E

気孔型 大判



朝日製薬株式会社

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、
関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、
しもやけ、骨折痛

成分及び分量 1m²中 dl-カンフル…1.80g サリチル酸メチル…9.00g ハッカ油…
1.20g l-メントール…4.50g トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g ノニル酸ワ
ニリルアミド…0.01g 添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、
テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチ
ルヘキシル共重合樹脂、ボリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、
香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

こりと痛みに

アサヒパスE

第3類医薬品

品目番号 H15-74-586



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことある人。

2. 次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

20枚入



朝日製薬株式会社

富山市太田口通り1-3-15

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931

用法及び用量

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関する注意】

(1)用法及び用量を厳守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(4)汗をかいり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(6)皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。

(4)開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173

お客様相談窓口

電話：076-479-1313

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)