

第3類医薬品

肩こり・関節痛
ファイナルバA

↓ ここから開けてください

第3類医薬品

20枚入

ファイナルバA

消炎鎮痛貼付剤

セルフメディケーション
税 控除 対象

使用期限

製造番号

外用鎮痛消炎薬 **ファイナルバA** 第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

⚠ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関連する注意】

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 20枚入

成分及び分量 1枚中
 ｵﾍﾞﾀﾞﾐﾝ・1.80g ﾏﾞﾙｼﾞﾝ・酢酸ﾆﾁﾃﾞｰﾙ・9.00g ﾏﾞﾝｶﾞ油・1.20g ﾄﾞﾈﾝﾄﾞｰﾙ・4.50g ﾄﾞﾂｺﾞﾍﾞｰﾙ・酢酸ｴﾂﾁﾙ(ﾃﾗﾐﾝ)・
 0.50g ﾉﾝﾄﾞﾙ・2.00g ﾏﾞﾙｼﾞﾝ・生工法・ﾁｯﾌﾟ・ﾌﾟﾚﾝ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・
 ﾏﾞﾙｼﾞﾝ・2-ｴﾃﾙ・ｴﾃﾙ・ｴﾃﾙ・共重合樹脂・ﾌﾟﾛﾍﾟｷﾞﾝ・ﾌﾟﾛﾍﾟｷﾞﾝ・ﾌﾟﾛﾍﾟｷﾞﾝ・ﾌﾟﾛﾍﾟｷﾞﾝ・ﾌﾟﾛﾍﾟｷﾞﾝ・ﾌﾟﾛﾍﾟｷﾞﾝ・ﾌﾟﾛﾍﾟｷﾞﾝ・
 205号を含有します。

T13

総代理店 大協薬品工業株式会社
 愛知県名古屋市天橋区南1-3
 お客様相談窓口 050(6)74(79)1313
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
 郵便番号 465-0824 05120-149-931

