

こりと
痛みに

はりぐすり

◆ここから開けてください

肩こり、腰痛、 関節痛に ケロンパスE

ビタミンE
配合



第3類医薬品

〈気孔付〉
20枚



<https://www.d1yk.co.jp/smts>

使用期限 (西暦 年/月) 製造番号

T21

外用鎮痛消炎薬 **ケロンパスE** 第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は使用しないこと
 - 天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

⚠ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果
腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコップや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたら、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所(1～2cm角)の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ外箱に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 20枚入

副作用検査救済制度
電話:0126-149-931(フリーダイヤル)

発売元 第一薬品工業株式会社
富山市 犀川 13-1

取扱店販売元 大協薬品工業株式会社
富山市 本橋 西 1-7-3
お客様相談窓口 電話 076-479-7130
受付時間 9:00～17:00(土日祝日を除く)

0003-97709



1



TA90-99T