

0001-6685



TA20-10T



富山堂薬品 株式会社



鎮痛消炎
貼用薬

こりと痛みに
配置期限
ロット番号

ニ-ジ-コ-ラビエ-A

第3類医薬品

鎮痛消炎
貼用薬

気孔付大型

ニ-ジ-コ-ラビエ-A

第3類医薬品 鎮痛消炎貼用薬



こりと痛みに
肌色

効能又は効果

腰痛,打撲,捻挫,肩こり,関節痛,筋肉痛,筋肉疲労,しもやけ,骨折痛

成分及び分量 1.0m²中

dl-カンフル...1.80g, サリチル酸メチル...9.00g, ハッカ油...1.20g, l-メントール...4.50g, トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)...0.50g, ノニル酸ワニルアミド...0.01g 添加物として, ポリブテン, 生ゴム, ポリイソブチレン, エステルガム, テルペン樹脂, 沈降炭酸カルシウム, 酸化チタン, アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂, ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル, 天然ゴムラテックス, 香料, 赤色405号, 黄色205号を含有します。

T11

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり,副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲,粘膜等。(2)湿疹,かぶれ,傷口。

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直ちに使用を中止し,この外箱を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤,かゆみ,痛み

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し,この外箱を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること

📄 用法及び用量

1日1~2回,ライナーをはがし,患部に貼ってください。

⚠ 用法及び用量に関連する注意

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には,保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)汗をかいたり,患部がぬれている時は,よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は,使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に,1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り,発疹・発赤,かゆみ,かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)皮膚の特に弱い人は,同じ部位に続けて貼らないでください。

📦 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり品質が変わります)。
- (4)開封後は袋の口を折り曲げ,外箱に入れて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 大判26枚入 ¥450+税



: 箱



: 外装フィルム

受付時間 9:00~17:00 (土,日,祝日を除く)

お客様相談窓口 電話:076-479-1313

富山市水橋島等173

大協薬品工業株式会社



製造販売元

電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

副作用被害救済制度