

外用鎮痛消炎薬 **ロ-ドパスC**

第3類医薬品

△ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗉 **相談すること**

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

用法及び用量

1日1～2回ライナーをはかし、患部に貼ってください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

成分及び分量 1.0㎡中

α-カンフル	1.80g	l-メントール	4.50g
サリチル酸メチル	9.00g	トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g
ハッカ油	1.20g		

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンニルフェニールエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社
 お客様相談窓口 電話 076-479-1313
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
 副作用被害救済制度 (※) 医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元 **日本薬剤株式会社** 製造販売元 **大協薬品工業株式会社**
 富山市東中野町一丁目1番1号 富山市水尾橋西173 1枚(6.2cm×4.2cm)



肌に優しくムレにくい

肩こり
 筋肉痛
 腰痛

ビタミンE配合

やわらか素材で
 ピッタリ密着

140枚
 (20枚×7袋)

第3類医薬品


サイズ
 6.2cm×4.2cm

肌に優しくムレにくい

肩こり
 筋肉痛
 腰痛

ビタミンE配合

やわらか素材で
 ピッタリ密着



第3類医薬品

セルフメディケーション


税 控除 対象

140枚
 (20枚×7袋)

サイズ
 6.2cm×4.2cm

肌に優しくムレにくい
 肩こり・筋肉痛・腰痛

やわらか素材で
 ピッタリ密着



第3類医薬品 保存袋付

ロ-ドパスC 140枚
 (20枚×7袋)