



腰痛・関節痛・肩こりに効く！インドメタシン配合

INDOME fit-T

インドメフィットT

10枚

第2類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

X



↓
切り取り線

ご使用後はファスナーを軽く押さえて開けてください。



↓
切り取り線

ご使用後はファスナーを軽く押さえて開けてください。

インドメフィットT

第2類医薬品 (外用鎮痛消炎薬)

▲ 使用上の注意

×してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の人は使用しないこと
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 11歳未満の小児。
 - 次の部位には使用しないこと
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - 連続して2週間以上使用しないこと

☑ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用期限

製造番号

効能又は効果 筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫

用法及び用量 ライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

【用法及び用量に関連する注意】

- 用法及び用量を厳守してください。
- 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、同じ箇所には続けて貼らないでください。

成分及び分量 膏体100g(0.70㎡)中 インドメタシン……2.625g
添加物として、流動パラフィン、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリイソブチレン、ミリスチン酸イソプロピル、ジブチルヒドロキシトルエン、メントールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 開封後はファスナーを閉めて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話 076-479-1313
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

■副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山市水橋 173

セルフメディケーション
税 控除 対象

10枚入(10cm×7cm) T31

