やまり膏E

気孔付　第3類医薬品

こりと痛みに

やまり膏E
第3類医薬品

こりと痛みに

はりぐすり
ロット番号
配置期限

こりと痛みに

効能又は効果
腰痛,打撲,捻挫,肩こり,関節痛,筋肉痛,筋肉疲労,しもやけ,骨折痛

成分及び分量　1.0m²中
ボーカンフル…1.80g，サリチル酸メチル…9.00g，ハッカ油…1.20g，l-メントール…4.50g，トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）…0.50g，ノニル酸ワニリルアミド…0.01g　添加物として，ポリブテン，生ゴム，ポリイソブチレン，エステルガム，テルペン樹脂，沈降炭酸カルシウム，酸化チタン，アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂，ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル，天然ゴムラテックス，香料，赤色405号，黄色205号を含有します。

鎮痛消炎薬 やまり膏E 第3類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなる）

1.次の人は使用しないこと
　天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
2.次の部位には使用しないこと
　(1)目の周囲，粘膜等.　(2)湿疹，かぶれ，傷口.

相談すること

1.次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
　薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
2.使用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに使用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　　膚	発疹・発赤，かゆみ，痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法及び用量
1日1～2回，ライナーをはがし，患部に貼ってください.

〈用法及び用量に関連する注意〉
(1)用法及び用量を厳守してください.
(2)小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください.
(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください.
(4)汗をかいたり，患部がぬれている時は，よく拭き取ってから使用してください.
(5)皮膚の弱い人は，使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に，1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り，発疹・発赤，かゆみ，かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください.
(6)皮膚の特に弱い人は，同じ部位に続けて貼らないでください.

[保管及び取扱い上の注意]
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください.
(2)小児の手の届かない所に保管してください.
(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります.）.
(4)開封後は袋の口を折り曲げ，外箱に入れて保管してください.
(5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください.

74mm×52mm　大判20枚入　￥400+税

紙：箱　プラ：外装フィルム

製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山市水橋畠等173
お客様相談窓口
電話:076-479-1313
受付時間 9：00～17：00（土,日,祝日を除く）
副作用被害救済制度
電話:0120-149-931（フリーダイヤル）

TA20-10T　0002-2690

01248

T11