

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないこと  
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないこと  
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

## 🗉 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効果又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

## 用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に胸の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚(6.2cm×4.2cm)

お問い合わせ先  
大協薬品工業株式会社  
お客様相談窓口 電話 076-479-1313  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 大協薬品工業株式会社  
富山市水橋島等173

## ⚠️ 使用上の注意

肩こり

筋肉痛

腰痛

穴あきタイプ  
ムレにくい

痛み

のもとに密着浸透!

成分及び分量	1.0mf中
dl-カンフル	1.80g
サリチル酸メチル	9.00g
ハッカ油	1.20g
l-メントール	4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g
ノニル酸ワニリルアミド	0.01g
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。	

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

140 枚入  
サイズ(6.2cm×4.2cm)

保存袋付