

こりと痛みみ2

開封口

第3類医薬品

税関特許
特許第4474号

中部薬品株式会社

- (気孔付)
- 筋肉痛
 - 捻挫
 - 肩のこり
 - 腰のいたみ

レブリシア

スポーツの筋肉痛に

効能又は効果
腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

成分及び分量 1m²中
 ガーカンフル→1.80g、サリチル酸メチル→9.00g、ハッカ油→1.20g、1-メントール→4.50g、トコフェロール酢酸エステル化タマン油→0.50g、フェニルグリニルアミド→0.01g
 添加物として、ポリアクリル酸、生ゴム、ポリアクリル酸、エステル化タマン油、テルペン樹脂、流動性高力カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。



こりと痛みみ2

使用期限

製造番号

121

発売元 中部薬品株式会社 製造販売元 大協薬品工業株式会社
 山梨県射水市戸原69-12 電話：0120-149-931
 副用枚数救急救済制度 電話：0120-149-931
 お客様相談窓口 電話：076-479-1313 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
 富山市水原町西番173

この外箱は製品とともに保管し、使用の際には必ずお読みください。

外用鎮痛消炎薬
 第3類医薬品 販売名：レモンバスA

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等、(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

⚠️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発赤・発赤、かゆみ、痛み

3.5~6日連続使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法及び用量

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコップや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 入浴時、蒸気浴による刺激を感じる場合がありますので、入浴の1時間前までは、はがしてください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所にて、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発赤・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめから使用してください。
- (7) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



74mm×52mm 20枚入 500円+税