


ジャストパップ[®] 第3類医薬品

ワンタッチタイプ
ネット+ハップをドッキング



はがしぐちテープを取り除いて貼ってください。

配置期限

製造番号

⚠️ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 膏体 100.0g中

dl-カンフル……………0.200g
l-メントール……………0.300g
サリチル酸グリコール……………1.000g
トコフェロール酢酸エステル……………0.300g
添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、モノオレイン酸ソルピタン、香料を含有します。

製造販売元  大協薬品工業株式会社
富山市水橋島等173
発売元  宮島薬品株式会社
富山市八町4370

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後はファスナーを閉めて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

TEL 076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

8枚入 (11.8cm × 7.5cm)

¥1,200 + 消費税 PP T12

