

トリプスES[®] 第3類医薬品

第3類医薬品

こりと痛みに

消炎鎮痛薬

トリプスES[®]

肩こり
腰痛



大判

発売元
御所薬舗株式会社
奈良県御所市1207

発売元 御所薬舗株式会社
奈良県御所市1207

製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山県水橋町等173
お客様相談窓口
電話：076-479-1313
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931
配置期限 ロット番号

はりぐすり

消炎鎮痛薬 トリプスES[®] 第3類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

💡 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

74mm×52mm 大判22枚入 ￥400+税

成分及び分量 1.0m²中 d,l-カンフル...1.80g、サリチル酸メチル...9.00g、ハッカ油...1.20g、
L-メントール...4.50g、トコエロール酢酸エステル(トキシニール)...0.50g、ニル酸ニリル
アミド...0.01g、添加物として、ポリブチレン、生ゴム、ポリブチレン、エチルカル、チレン
ン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル
ル共重合樹脂、ポリオキシエチレンニルエニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色
405号、黄色205号を含有します。



2000