


貼って、冷やせるシップ剤

ハッブルG



第3類医薬品

タテ・ヨコ 伸縮自在 7枚入

うちみ

ねんざ

筋肉痛

肩こり

ファスナー

ここからハサミでお切りください。
開封後はファスナーを軽く押えて閉めてください。



ファスナー

開封後はファスナーを軽く押えて閉めてください。



(鎮痛消炎薬)

[サリチル酸グリコール]

- 皮膚吸収度が大きく、鎮痛消炎効果があります。
- [トコフェロール酢酸エステル]**
- 血行促進に効果のあるビタミンEです。
- [l-メントール・dl-カンフル]**
- 鎮痛消炎・冷却効果にすぐれ、患部の痛み、はれに効果的です。



腰 痛



うちみ



ねんざ



肩のこり

配置期限

ロット番号

⚠ 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- 目の周囲、粘膜等。
- 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

- 次的人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量

膏体 100g 中

dl-カンフル 0.200 g

l-メントール 0.300 g

サリチル酸グリコール 1.000 g

トコフェロール酢酸エステル 0.300 g

添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリacrylic acid部分中和物、セラチン、

カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸デンプン、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタンを含有します。

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1回~2回、膏面のライナーを静かにはがし、そのままか、あるいは適当な大きさに切り患部に貼ってください。なお、必要に応じ、包帯、粘着テープ等で固定してください。

用法及び用量に関する注意

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください
(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 開封後はファスナーを閉めて保管してください。
- 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

☎ 076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



7枚入(12cm×7cm)¥800+税

発売元 株式会社 廣貴堂

製造販売元 大協薬品工業株式会社
富山市水橋島等173