

腰の痛み

肩の痛み

タミトール[®]

第3類医薬品



製造番号

使用期限

第3類医薬品

TAMITOLL[®] PASS N1

次第に効く

を解消する
腰の痛み

肩の痛み

T11

TAMITOLL[®] PASS N1

第3類医薬品

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

肩のこり
腰の痛み

販売名：タミトールパスN1 消炎鎮痛薬 第3類医薬品

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと
天然アレルギーによるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等
(2)腫瘍、かぶれ、傷口。

【相談すること】

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しみやけ、骨折痛

用法及び用量
1日1~2回、ライナーをせまい、患部に貼ってください。
〈用法及び用量に関する注意〉

- 1用法及び用量を誤ってください。
2小児で使用する場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3貼った患部をコットンや電気毛布等で温めないでください。
4汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
5皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に1~2cm角の小片を目安とし
て半日以上貼り、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから
使用してください。
6皮膚特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

成分及び量
1.0ml中
dl-カブフル 1.80g I-メントール 4.50g
サリチル酸メチル 9.00g トコフェロール酢酸エチル(ビタミンE) 0.50g
パック油 1.20g ノニル酸ワリルアミド 0.01g
添付物質として、ポリプロピレン、生ゴム、ポリイソブチレン、エチルガム、テルペン樹脂、沈降波酸カル
シウム、糊化チクノ、アクリル酸メチル、アクリル酸-2-メチルヘキシル共重合樹脂、ボリオキシジ
チラム、ノーリエニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

保管及び取扱い上の注意
1)直射日光の当たらない涼気の少ない涼しい所に保管してください。

2)小児の手の届かない所に保管してください。
3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
4)開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。

5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
お問い合わせ先
大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口 電話：076-479-1313
受付時間 9：00~17：00 (土、日、祝日を除く)

発売元 大協薬品工業株式会社 製造販売元
富士市水橋町173 1枚(7.4cm×5.2cm)

