

肩こり

痛みのもとに
密着浸透!

140 枚入
(6.2cm×4.2cm)

保存袋付

開封口▶▶▶

鎮痛消炎プラスター
ニューパス(A) 第3類医薬品

肩こり・筋肉痛・腰痛

販売名: ニューパス(A) 外用鎮痛消炎薬 第3類医薬品

⊗ してはいけないこと
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 1. 次の人は使用しないこと
 天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないこと
 (1) 目の周囲、粘膜等。
 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

⊗ 相談すること
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果
 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

用法及び用量
 1日1〜2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。
 (用法及び用量に関連する注意)
 (1) 用法及び用量を厳守してください。
 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
 (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
 (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1〜2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
 (6) 皮膚の強い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。
 1枚(6.2cm×4.2cm)

成分及び分量 1.0m²中
 dl-カンフル1.80g
 サリチル酸メチル9.00g
 ハツカ功1.20g
 トメントール4.50g
 トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)0.50g
 ノニル酸ワニルアミド0.01g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

保管及び取扱い上の注意
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 大協薬品工業株式会社
 山形県大曲町1-7-3
 副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)

お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社
 お客様相談窓口
 電話: 076-479-1313
 受付時間 9:00〜17:00(土日、祝日を除く)

痛みのもとに
密着浸透!

140 枚入
(6.2cm×4.2cm)

保存袋付



肩こり



筋肉痛



腰痛

鎮痛消炎プラスター
ニューパス(A) 第3類医薬品

ムレにくい
穴あき
タイプ

痛みのもとに
密着浸透!

140 枚入
(6.2cm×4.2cm)

保存袋付

痛みのもとに
密着浸透!

140 枚入
(6.2cm×4.2cm)

保存袋付



肩こり



筋肉痛



腰痛

鎮痛消炎プラスター
ニューパス(A) 第3類医薬品

ムレにくい
穴あき
タイプ

肩こり
筋肉痛
腰痛

ビタミンE配合

ムレにくい
穴あき
タイプ

鎮痛消炎プラスター
ニューパス(A) 第3類医薬品

製造番号
使用期限



4 987754 103637

TAG0-79Y
水X1A079MB
1
0016-2072

T21