

肩こり・筋肉痛・腰痛に  
ワイドソフトパス

第3類医薬品

肩こり・筋肉痛・腰痛に

↓ここからあけてください

開封口

手のひらタッチな  
貼り心地

外用鎮痛消炎プラスター

肩こり  
筋肉痛・腰痛に

ワイドソフトパス

どこでも  
手のひら貼り

薄型 白色

20枚入 (70cm×5.0cm)

セルフメディケーション  
税 控除 対象

第3類医薬品

外用鎮痛消炎プラスター

20枚入

使用期限

製造番号



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(知) 医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売名:ワイドソフトパス 外用鎮痛消炎薬 第3類医薬品

こんな方におすすめ 肩こり・筋肉痛・腰痛でお困りの方

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと  
(1)目の周囲、粘膜等、(2)湿疹、かぶれ、傷口。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腫痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法及び用量】

1日数回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関する注意】

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【成分及び分量】 膏体100g中

サリチル酸メチル ..... 10.0g  
トメントール ..... 3.0g  
トコフェロール酢酸エステル ..... 2.0g  
添加物として、シブチルヒドロキシトルエン、脂肪酸塩酸化水素樹脂、ステレン・インブレン・ステレンブロック共重合体、タルク、ポリインブチレン、流動パラフィンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話:076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

内容 7.0cm×5.0cm 20枚入

製造販売元 大協薬品工業株式会社  
富山市永穂通等173



C012

T21