

この外箱は製品とともに保管し、使用の際には必ずお読みください。

外用鎮痛消炎薬 販売名:ピタコリ Z

第3類医薬品

こんな方におすすめ 肩こり・筋肉痛・腰痛でお困りの方



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法及び用量】

1日数回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

【包装】20枚入(1枚:7.0cmx5.0cm)

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話:076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋通等173

発売元:ナガワ薬品株式会社

東京都台東区東上野3-14-7

