

(切り取り線)



開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください。

第3類医薬品

ビタミンE配合

外用薬

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

微香性 **リードエールT** 7枚入 (14cm×10cm)

外用鎮痛消炎薬 販売名:リードエールT **第3類医薬品**

【特長】

- 打撲(うちみ)、捻挫などの急性炎症で、熱感があるときも、水分を含む基剤の湿布効果で適度な冷感が保たれます。
- 伸びのよい特殊な不織布を使用していますので、ひじやひざなどの関節部分の動きにもピッタリフィットします。
- ビタミンEが末梢血管の動きをよくし、血液の流れをスムーズにします。

⚠ 使用上の注意

- ⊗ してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

- 👤 相談すること**
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

【用法及び用量】

1日1~2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法及び用量に関連する注意>

1. 定められた用法及び用量を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 必要に応じて包帯などで固定してください。

【成分及び分量】 膏体100g(1167cm²)中の成分

サリチル酸グリコール.....1.0g
 l-メントール.....0.8g
 トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE).....0.3g
 添加物として、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリソルベート80、モノオレイン酸ソルピタン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、アクリル酸デンプンを含有します。

製造販売元 **TKC 大協薬品工業株式会社**
富山市水橋島等173



お客様相談窓口 電話:076-479-1313
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)