




切り取り線

開封後はファスナーを閉めて保管してください。

外用薬

粘着シート1体型パップ剤



第3類医薬品

シートパップ

【保管及び取扱い上の注意】

1. ご使用の際は、はがしぐちテープを取り除いて貼ってください。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
3. 小児の手の届かない所に保管してください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
5. 開封後はファスナーを閉めて保管してください。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

6枚入



開封後はファスナーを閉めて保管してください。

微香性 シートパップ6枚入 (11.9cm×7.7cm)

外用鎮痛消炎薬

第3類医薬品

【特長】

使用期限

- 膏体と粘着シートを一体化した、大協だけのオリジナル商品です。
- 水分を含む基剤の冷却効果で適度な冷感が保たれます。
 - 肩やひじ・ひざなど、手足の関節部にもピッタリフィットする密着性。
 - 微香性なので、外出時に貼ってもにおいが気になりません。
 - 血流促進に効果のあるビタミンEを配合しています。

⚠ 使用上の注意

製造番号

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

【用法及び用量】

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性がありますので、使用を控えてください。

【成分及び分量】 膏体100.0g中

dl-カンフル	0.200g
I-メントール	0.300g
サリチル酸グリコール	1.000g
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	0.300g
添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアミノウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタン、香料を含有します。	

製造販売元

TK 大協薬品工業株式会社

富山市水橋島等173

お客様相談窓口 電話 076-479-1313

受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

