

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



手などの湿疹に

エマゼン軟膏

第2類医薬品

〈鎮痒消炎薬〉

◆水仕事・お掃除など動く手は、多くの刺激を受けかゆみ・湿疹を引き起こしがちです。エマゼン軟膏は、かゆみの原因となる炎症症状をしずめ、なめらかで健やかな手肌へ導きます。患部にしっかり密着する軟膏タイプです。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- ② 顔面には、広範囲に使用しないでください
- ③ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
(6) 深い傷やひどいやけどの人。
- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【注意】


- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

※患部をきれいにしてからお薬を塗ってください。

※指先で強くこすらないように薄く塗布します。

※治りかけたら、回数を減らしてください。

※使用后、手についたお薬はふき取ってください。



〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

成分

100g中

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	湿疹・かぶれなどの炎症をおさえ、発赤・はれをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。
トコフェロール酢酸エステル	2.0g	血行を良くして、患部の治りをはやめます。
レチノールパルミチン酸エステル	200000I.U.	肌の代謝に働きかけ、なめらかにします。
dl-メントール	0.5g	患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。

添加物：ミリスチン酸オクチルドデシル、セレシン、パラフィン、乳酸セチル、ゲル化炭化水素、プロピレングリコール、ポリソルベート60、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)