

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

ご使用の際には、この説明文書をよくお読み下さい。

効能・効果

かゆみ、虫さされ、じんましん、あせも、しもやけ、ただれ、かぶれ、湿疹、皮膚炎

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 本剤は、使用期限内に使用してください。なお、期限を過ぎたものは使用しないでください。

販売名 クリームポピーS

特 徴

第2類医薬品

クリームポピーSは、生薬の甘草に由来するグリチルレチン酸、薄荷に由来する l-メントールを配合したクリーム状の軟膏です。

クリームポピーSは、日常の肌のかゆみやかぶれ、じんましん、あせもなどの皮膚の不快感をやわらげ、アレルギー症状などによる皮膚炎にも優れた効果を発揮します。

製造番号

使用期限

20g

800



高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10

TEL0744-54-2514

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

A8

かゆみ 虫さされ

クリーム

鎮痒消炎薬

ポピーS

生薬由来成分配合

第2類医薬品

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

成分・分量 100g中

グリチルレチン酸(甘草に由来する成分)…1g リドカイン…2g
l-メントール(薄荷に由来する成分)……3g dl-カンフル…2g
ジフェンヒドラミン……………1g

添加物：ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー