

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

インドメタシン 経皮吸収型鎮痛消炎剤

第2類医薬品

リフェンダID 0.5%

24枚入

【特徴】

- 肩・腰・関節などの痛みにすぐれた効果を発揮する鎮痛・消炎パップ剤です。
- インドメタシンが患部に直接浸透し、痛みの原因プロスタグランジンの発生を抑えます。
- 伸縮性に富んだ不織布を使用しているため、すぐれたフィット感が得られます。

⚠【使用上の注意】

してはいけないこと 〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 次の人は使用しないでください。  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。  
(3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。  
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

腰痛、関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 汗をかいていたり、患部がぬれていたりする時は、よく拭き取ってから使用してください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 連続して2週間以上使用しないでください。

【成分・分量】〈膏体100g(1000cm<sup>2</sup>)中〉

インドメタシン……………0.5g

添加物:ベンジルアルコール、ポリソルベート80、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、カルボキシビニルポリマー、酒石酸、エデト酸Na水和物、トコフェロール酢酸エステル、ビタミンC、L-メントール、カオリン、酸化チタン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセート、1,3-ブチレングリコール、ヒマシ油、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。〔誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。〕
- (4) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- (5) 開封後は、未使用分を袋に戻しチャックを閉じて保管してください。  
また、品質保持の点からなるべく早くご使用ください。



〔包装〕24枚入  
(6枚入×4袋 / 1枚:10cm×14cm)

発売元: ゲンキー株式会社  
〒910-0332  
福井県坂井市丸岡町下久米田38-33

商品に関するご質問・お問い合わせは下記まで。  
製造販売元: 株式会社タカミツ  
〒462-0803  
名古屋市北区上飯田東町4の68の1  
**0120-459533**  
受付時間 [月～金曜日9:00～17:00祝日を除く]

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



製造番号

使用期限

開  
け  
口

