

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

(8枚×2袋)

第2類医薬品

# シンパスFBテープα16枚入

特

- 有効成分フェルビナクを5.0%配合しています。
- フェルビナクが痛みの原因(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節などの痛みに効果的です。
- 2-メントールを3.0%配合していますので、すっきり爽快な使用感です。
- 可動部にもぴったりフィットする、たて・よこ伸縮自在のテープ剤です。
- 溶剤を使用しないホットマルト製法で製造していますので、皮膚刺激の心配が少ないテープ剤です。
- おいがひかえめ(微香性)で気になりません。
- ライナーに3分割フィルムを採用していますので、貼りやすいです。
- チャック付の薬袋で、未使用分の保存に便利です。

長

## △ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2) せんぞくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲・粘膜等。(2) 湿疹・かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむじ等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

### ☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ・はれ・ヒリヒリ感・かぶれ・水泡

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどの(アナフィラキシー)かゆみ、息苦しさ、悸動、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘等)、打撲、捻挫

### 【用法・用量】

- 表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
- 15歳未満の小児は使用しないでください。

### 【用法・用量に関する注意】

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- 汗をかいり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

### 【成分・分量】

膏体100g中 (1枚 7cm×10cm、膏体量 0.7g)  
フェルビナク………5.0g 2-メントール………3.0g  
添加物：BHT、タルク、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、  
テルペン樹脂、流動パラフィン

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない通気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、チャックをしっかりしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元 株式会社 タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いします。  
株式会社 タカミツ 電話 0120-459533(フリーダイヤル)  
受付時間(月~金曜日) 9:00~17:00 祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931



4 987487 103133