

腰痛・関節痛・肩こりに伴う肩の痛みに インドメタシン+トウガラシエキス配合

経皮吸収型消炎貼付剤
スギルパズ回温感

第2類医薬品

24枚入
(6枚入×4袋)



使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

経皮吸収型消炎貼付剤

スギルパズ回温感 24枚入

第2類医薬品



特徴

- 肩・腰・関節などの痛みにすぐれた効果を発揮する鎮痛・消炎パップ剤です。
- インドメタシンが患部に直接浸透し、痛みの原因プロスタグランジンの発生を抑えます。
- トウガラシエキスが、患部に適度な温感効果をもたらします。
- 伸縮性に富んだ不織布を使用しているため、すぐれたフィット感が得られます。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい

- [1] 本剤によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。[以前お薬を使用してアレルギー症状を起こしたことがある人は、再び同じお薬を使用すると更に強い症状を起こす可能性があります。]
[2] ぜんそくを起こしたことがある人。[ぜんそくのある人がインドメタシン等の消炎剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがあります。]
[3] 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないで下さい

- [1] 目の周囲、粘膜等。[2] 湿疹、かぶれ、傷口。[3] みずむし、たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないで下さい

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- [1] 医師の治療を受けている人。[2] 妊婦又は妊娠していると思われる人。[3] 本人又は家族がアレルギー体質の人。[4] 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

👉 効能・効果

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

📄 用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼って下さい。

📖 用法・用量に関する注意

[1] 定められた用法・用量を厳守して下さい。[2] 痛みやはれ等の症状がある場合だけ使用して下さい。(本剤は、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であり、原因となっている病気を治療するものではありません。)[3] 汗をかいていたり、患部がぬれていたりする時は、よく拭き取ってから使用して下さい。[4] 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に貼り続けしないで下さい。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。)[5] 打撲(打ち身)、捻挫に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用して下さい。[6] 本剤を使用してから汗をかくと刺激を感じることがあります。[7] 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないで下さい。[8] 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないで下さい。[9] 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないで下さい。(強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分程してから使用して下さい。)

🧪 成分・分量 <膏体100g(1000cm²)中>

インドメタシン…0.5g トウガラシエキス…0.1g(原生薬換算量1.25g)
添加物:エデト酸Na水和物、マクロゴール、CMC-Na、酸化チタン、カオリン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、香料、グリセリン、D-ソルビトール、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、酒石酸、カルボキシビニルポリマー、パラベン、ヒマシ油

🔒 保管及び取扱い上の注意

[1] 高温・直射日光をさけ、なるべく湿度の少ない涼しい所に保管して下さい。[2] 小児の手の届かない所に保管して下さい。[3] 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)[4] 開封後は未使用分を袋に戻し、チャックを閉じて保管して下さい。[5] 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早くご使用下さい。

[包装] 24枚入(6枚入×4袋/1枚:10cm×14cm)

製造販売元

株式会社タカミツ

名古屋市北区上飯田東町4の58の1 〒462-0803

発売元

株式会社奥田薬品

兵庫県尼崎市道意町6丁目36の2 〒660-0083

📞 お問い合わせ先

株式会社タカミツ

フリーダイヤル 0120-459533

受付時間 [月～金曜日 9:00～17:00 祝祭日を除く]

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造番号

使用期限