




フェルビナクが  
患部に直接浸透!

ジェル

リファダジェル  
有効成分  
**フェルビナク**  
3%配合  
**肩・腰・関節**

の  
痛みに!

ジェル



60g 第2類医薬品

【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

- 次の人は使用しないでください。  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) 化膿している患部。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれなど

まれに下記のような症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 1週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

リファダジェル  
第2類医薬品

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかり締めてください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- 火気に近づけないでください。
- メカネ、時計、アクセサリー等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造番号  
使用期限



製造販売元  
**株式会社 タカミツ**  
名古屋市北区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記をお願いします。  
株式会社 タカミツ  
電話0120-459533(フリーダイヤル)  
受付時間  
〔月～金曜日 9:00～17:00祝日を除く〕

火気厳禁  
第二石油類



【特徴】

優れた鎮痛・消炎効果をあらわす  
「フェルビナク」を主成分として3%配合!

- 肩・腰・関節などの痛み優れた効き目を発揮する鎮痛・消炎ジェルです。
- 有効成分フェルビナクが患部に直接浸透し、痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の発生を抑えます。
- L-メントール3%配合、スッキリとした爽快感です。
- なめらかなジェルが患部にムラなく伸び、サラッとした使い心地です。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】

- 1日2～4回、適量を患部に塗擦してください。  
(用法・用量に関する注意)  
(1) 定められた用法を守ってください。  
(2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。  
(3) 外用のみに使用してください。  
(4) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】(100g中)

成分	含量	作用
フェルビナク	3.0g	炎症を抑え、痛みを和らげる。
L-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みを和らげる。

添加物として、カルボキシビニルポリマー、水酸化Na、ジイソプロパノールアミン、ベンジルアルコール、1,3-ブチレングリコール、イソプロパノール、アルコール、エト酸Na



1234  
5678

開封年月日  
年 月 日  
開封時に記入してください

HapYcom ハピコム 第2類医薬品  
みんなの声で、よくなるね。

**フェルビナク製剤 ゲル**

用法・用量 1日2~4回、  
適量を患部に塗擦  
対象年齢 15歳以上

**使用上の注意**

**※してはいけないこと**

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
1. 次の人は使用しないでください  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。  
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) 化膿している患部。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.1週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

環境にやさしいパッケージです。  
280  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

HapYcom 第2類医薬品

**鎮痛消炎剤  
フェルビナク製剤  
リフェンダゲル ゲル**

**肩 腰  
筋肉 関節**

**の痛みを抑える**



対象年齢 15歳以上  
内容量 60g

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**保管及び取扱い上の注意**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 火気に近づけないでください。
- メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

製造番号  
使用期限

製造販売元  
**株式会社 タカミツ**  
名古屋市中区上飯田町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記をお願いします。  
株式会社 タカミツ  
電話0120-459533(フリーダイヤル)  
受付時間  
(月~金曜日 9:00~17:00祝日を除く)

火気厳禁  
第二石油類

鎮痛消炎剤 Pain Relief Gel 第2類医薬品

**リフェンダゲル**

**【特徴】**

- 優れた鎮痛・消炎効果をあわす「フェルビナク」を主成分として3%配合!
- 肩・腰・関節などの痛み優れた効き目を発揮する鎮痛・消炎ゲルです。
  - 有効成分フェルビナクが患部に直接浸透し、痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の発生を抑えます。
  - L-メントール3%配合、スッキリとした爽快感です。
  - なめらかなゲルが患部にムラなく伸び、サラッとした使い心地です。

**効能・効果**  
肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

**用法・用量**  
1日2~4回、適量を患部に塗擦してください。

- (用法・用量に関連する注意)  
(1) 定められた用法を守ってください。  
(2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。  
(3) 外用のみに使用してください。  
(4) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

**成分・分量 100g中**

成分	含量	作用
フェルビナク	3.0g	炎症を抑え、痛みを和らげる。
L-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みを和らげる。

添加物として、カルボキシビニルポリマー、水酸化Na、ジイソプロパノールアミン、ベンジルアルコール、1,3-ブチレングリコール、イソプロパノール、アルコール、エト酸Na

