

シンパスジクロフェナクテープ

14枚入(7枚×2袋) 第2類医薬品

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

- 特長** ● ジクロフェナカナトリウムを有効成分として配合した鎮痛消炎テープ剤です。● においがひかえめ(微香性)です。
● たて・よこ伸縮自在のテープ剤で、関節にもびったりフィットします。● 保存に便利なチャック付袋です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊娠または妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等または化膿している部位。
 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください
 4. 連続して2週間以上使用しないでください

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)他の医薬品を使用している人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。(5)次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ (6)次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、ストレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスボリン、選択的セトニン再取り込み阻害剤 (7)高齢者。

2. 使用中または使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この個装箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、アカ)のような皮ふのはがれ、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があられます。

接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮ふ炎症や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる事があります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。
-------------	---

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この個装箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

開けてください

[効能・効果]

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

[用法・用量]

○プラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。 ○15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量をお守りください。(2)1回あたり、24時間を超えて貼り続けないでください。さらに同じ患部に貼りかかる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取つから使用してください。(5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6)同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

[成分・分量(膏体100g中)] ジクロフェナカナトリウム……………1g (1枚7cm×10cm、膏体量1.5g)

添加物:スチレン・イソプレン・スチレンブロックポリマー、テルペン樹脂、合成スクワラン、流動パラフィン、イソステアリン酸、タルク、l-メントール、BHT

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります)(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のチャックを閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

製造販売元 株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上新田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いします。
株式会社 タカミツ ☎ 0120-459533(フリーダイヤル)
受付時間(月～金曜日 8:00～17:00 祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 987487 103720

