

切り口

切り口からゆっくり開封してください

切り口

開封後は、ファスナー部を合わせて密封保存してください

鎮痛消炎薬 第2類医薬品 リフェンダLXテープ 7枚入

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【X】 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用して
せんそくを起こしたことがある人。
- (3)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。(2)しつしん、かぶれ、傷口。
- (3)のすむいたむい等または化膿している部位。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

4. 連続して2週間以上使用しないでください

- (本剤は痛みを一時的におさえますので、痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起
こしたことがある人。(3)妊娠または妊娠していると思われる人。(4)高
齢者。(5)次の診断を受けた人。気管支ぜんそく

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手、手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

製造番号

使用期限

用途・用量

◎表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

<用途・用量に関連する注意>

- (1)用途・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやは
れ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやは
れ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場
合だけ使用してください。(3)1日あたり4枚を超えて使用し
ないでください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、
よく拭き取ってから使用してください。(5)皮ふの弱い人は、
使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片
を日安として半日以上貼り、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の
症状が起きないことを確かめてから使用してください。

製造販売元 株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いします。
株式会社 タカミツ 電話0120-459533(フリーダイヤル)
受付時間(月～金曜日 9:00～17:00 祝日を除く)

成分・分量(膏体100g中) 1枚7cm×10cm、膏体量1g

ロキソプロフェンナトリウム水和物…5.67g(無水物として5g)

添加物: L-メントール、ミリチラン酸イソブロピル、BHT、タ

ルク、ステレン-インプレン-ステレンブロックコポリマー、テル

ベン樹脂、流動パラフィン、その他2成分

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない温湿度の少ない涼しい所に保管して
ください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(4)品質の原因にな
つたり品質が変わることがあります。(5)品質保持のため、未
使用分は袋に入れ、開封部のファスナーを閉めて保管してくだ
さい。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。ま
た、開封後はなるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

