

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。



第3類医薬品
外用鎮痛消炎パップ剤

セルフメディケーション
税 控除 対象

32枚入
(8枚入×4袋)

販売名: **ボルテス**

特 徴

- 貼り薬特有のニオイをおさえた爽香性タイプの冷感シップ剤です。
- 粘着力が強く、皮ふにピタッと良くつきます。
- 4つの有効成分が患部に効果をあらわします。
- 伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]
次の部位には使用しないで下さい。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口

📞 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、腰痛、肩こり、骨折痛、しもやけ

用法・用量

表面のフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付して下さい。
必要な時は、包帯又はテープでとめて下さい。

用法・用量に関する注意

- 1.定められた用法・用量を守って下さい。
- 2.体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付して下さい。
- 3.本剤に触れた手で、目、鼻腔、唇などの粘膜に触れないよう注意して下さい。
- 4.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の下に使用させて下さい。

成分・分量 (膏体100g中)

サリチル酸グリコール ……1.5g l-メントール ……0.5g
トコフェロール酢酸エステル…0.3g グリチルレチン酸 ……0.05g
※添加物としてエデト酸Na水和物、カオリン、酸化チタン、CMC-Na、ジヒドロ
キシアルミニウムアミノアセート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリ
ソルベート80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、カルボ
キシビニルポリマー、ヒマシ油、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2.使用後は、未使用分を袋に戻し、外気に触れないよう開封口のチャックをきき
んと閉めて保管して下さい。
- 3.小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 4.他の容器に入れ替えないで下さい。

【誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。】

- 5.使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
- 6.開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

【包装】32枚入(8枚入×4袋) / 1枚: 10cm×14cm

製造販売元

株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市中区上飯田東町4の68の1

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いします。
株式会社タカミツ フリーダイヤル 0120-459533
受付時間(9:00～12:00、13:00～17:00土・日・祝日を除く)



製造番号

使用期限

開
け
口