

切り口

切り口からゆっくり開封してください

切り口

開封後は、ファスナー部を合わせ密封保存してください

外用薬

経皮吸収型鎮痛消炎剤

肩の痛み・関節痛・腰痛に

フェルビナク

フェルビナク5%配合テープ剤

リフェンダFBテープEX

第2類医薬品

開封日

年

月

日

takamitsu

切り口

切り口からゆっくり開封してください

切り口

開封後は、ファスナー部を合わせ密封保存してください

第2類医薬品 鎮痛消炎剤

販売名:リフェンダFBテープEX

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) しっしん、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性があります)

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

○表面のライナー(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。○15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量(膏体100g中) 1枚7cm×10cm、膏体量0.7g

フェルビナク…5.0g
l-メントール…4.2g
トコフェロール酢酸エステル…2.3g
添加物:BHT、タルク、スチレン・イソプレン・スチレンブロック
コポリマー、テルペン樹脂、流動パラフィン

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元 株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いします。
株式会社 タカミツ 電話 0120-459533(フリーダイヤル)
受付時間(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

A