

外用 鎮痛・消炎剤

by amazon

【成分・分量】100g中

フェルピナク……………3.0g
 〇-メントール……………6.0g
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.1g
 添加物としてプロピレン
 グリコール、カルボキシビ
 ニルポリマー、ヒドロキシ
 プロピルセルロース、エデ
 ト酸Na、ジソプロパ
 ノールアミン、エタノール
 を含有する

【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない
 湿気の少ない涼しい所に
 密栓して保管してくださ
 い。(2) 小児の手の届かない
 所に保管してください。
 (3) 揮発性がありますので、
 使用後はキャップをしつ
 かり締めてください。(4)
 他の容器に入れ替えない
 てください。(誤用の原因
 になったり、品質が変わる
 ことがあります。)(5) 火気
 に近づけないでください。
 (6) メガネ、時計、アクセサ
 リー等の金属類、繊維の衣
 類、プラスチック類、床や家
 具等の塗装面などに付着
 すると変質又は変色する
 場合がありますので、付着
 しないように注意してくだ
 さい。(7) 使用期限を過ぎた
 ものは使用しないでくださ
 い。また、開封後は使用期
 限内であってもなるべく速
 やかに使用してください。

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、
 関節痛、腰痛、打撲、捻挫に

外用 鎮痛・消炎剤

フェルピナク3%配合

ゲルタイプ

by amazon

フェルピナク3.0g
 〇-メントール6.0g
 クロルフェニラミンマレイン酸塩0.1g配合
 (100g中)



製造販売元
 株式会社 タカミツ
 名古屋市北区上飯田東町4の68の1
 本剤についてのお問い合わせは、
 下記をお願いします
 株式会社タカミツ
 0120-459533(フリーダイヤル)
 受付時間
 月～金 9:00～12:00
 13:00～17:00
 土・日・祝日を除く

第2類医薬品

リファンダFBゲルEX

セルフメディケーション
 税 控 除 対象

50g



製造番号 使用期限

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋
 肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎
 (手・手首・足首の痛みと腫
 れ)、肘の痛み(テニス肘な
 ど)、打撲、捻挫

【用法・用量】

●1日2～4回、適量を患部
 に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 定められた用法・用量を
 守ってください。(2) 目に入
 らないように注意してくだ
 さい。万一、目に入った場合
 には、すぐに水又はぬるま
 湯で洗ってください。なお、
 症状が重い場合には、眼科
 医の診療を受けてください。
 (3) 外用のみに使用してく
 ださい。(4) 薬剤塗布後の
 患部をラップフィルム等の
 通気性の悪いもので覆わ
 ないでください。



by Amazon ブランドストア

製造販売元

株式会社 タカミツ

名古屋市北区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、

下記をお願いします

株式会社タカミツ

0120-459533(フリーダイヤル)

受付時間

月～金 9:00～12:00

13:00～17:00

土・日・祝日を除く

副作用被害救済制度の問い合わせ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
 ☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

開け口

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるよう保管してください。

優れた鎮痛・消炎効果をあらわす

「フェルピナク」を主成分として3%配合!

- 肩・腰・関節の痛みに優れた効き目を発揮する鎮痛・消炎ゲルです。
- 有効成分フェルピナクが患部に直接浸透し、痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の発生を抑えます。
- 〇-メントール6.0%配合、スッパリとした爽快感です。
- なめらかなゲルが患部にムラなく伸び、サラッとした使い心地です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
 その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、ラキシー
動悸、意識の混濁等	あらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

2401-AHI