

外用 鎮痛・消炎剤

by amazon

【成分・分量】100mL 中

フェルビナク…………… 3.0g
 ｻ-ﾒﾝﾄｰﾙ…………… 6.0g
 クﾛﾙﾌｴﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩…………… 0.1g
 添加物としてプロピレングリ
 コール、ジブチルヒドロキシ
 トルエン、トリエタノールアミン、
 エタノールを含有する

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿
 気の少ない涼しい所に密栓し
 て保管してください。(2) 小児
 の手の届かない所に保管して
 ください。(3) 揮発性がありま
 すので、使用後はキャップを
 しっかり締めてください。(4)
 他の容器に入れ替えないでく
 ださい。(誤用の原因になっ
 たり、品質が変わることがあり
 ます。)(5) 火気に近いでな
 ください。(6) メガネ、時計、ア
 クセサリー等の金属類、化繊の
 衣類、プラスチック類、床や家
 具等の塗装面などに付着する
 と変質又は変色する場合があ
 りますので、付着しないよう
 に注意してください。(7) 使用期
 限を過ぎたものは使用しない
 てください。また、開封後は使
 用期限内であってもなるべく
 速やかに使用してください。



by Amazon ブランドストア



4 987487 104482

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、
 関節痛、腰痛、打撲、捻挫に

外用 鎮痛・消炎剤

フェルビナク3%配合

ローションタイプ

by amazon

フェルビナク3.0g
 ｻ-ﾒﾝﾄｰﾙ6.0g
 クﾛﾙﾌｴﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩0.1g配合
 (100mL中)



第2類医薬品

リフェンダFBローションEX

セルフメディケーション
 税 控 除 対 象

100mL



製造番号 使用期限

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、
 関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・
 足首の痛みと腫れ)、肘の痛み
 (テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

●1日2～4回、適量を患部に塗
 布してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 定められた用法・用量を守
 ってください。(2) 目に入らない
 ように注意してください。万一、目
 に入った場合には、すぐに水又は
 ぬるま湯で洗ってください。なお、
 症状が重い場合には、眼科医の
 診療を受けてください。(3) 外用
 のみに使用してください。(4) 薬
 剤塗布後の患部をラップフィル
 ム等の通気性の悪いもので覆わ
 ないでください。(5) 皮膚の弱い
 人は、同じところに続けて塗布し
 ないでください。(6) 入浴後にご
 使用になった場合は、強い刺激
 (ヒリヒリする等)を感じることに
 あります。この場合はすぐに石け
 ん又はぬるま湯で洗い流してく
 ださい。(7) スポンジに薬液を十
 分しみこませてから患部に塗布
 してください。薬液をスポンジ面
 に浸透させずに使用すると、ス
 ポンジが破損する場合があります。

製造販売元

株式会社 タカミツ

名古屋市中区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、
 下記をお願いします
 株式会社 タカミツ
 0120-459533(フリーダイヤル)
 受付時間

月～金 9:00～12:00
 13:00～17:00
 土・日・祝日を除く

副作用被害救済制度の問い合わせ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
 ☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

開け口

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるよう保管してください。

優れた鎮痛・消炎効果をあらわす 「フェルビナク」を主成分として3%配合!

- 肩・腰・関節の痛みにより優れた効果を発揮する鎮痛・
 消炎ローションです。
- 有効成分フェルビナクが患部に直接浸透し、痛みに関
 係する物質(プロスタグランジン)の発生を抑え
 ます。
- ｻ-ﾒﾝﾄｰﾙ6.0%配合、スツキリとした爽快感です。
- 首の曲がっているボルト使用で、塗りにくかった患
 部にも上手に塗布できます。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやす
 くなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こし
 たことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満
 の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みず
 むし、たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談
 してください。
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレ
 ルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能
 性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持
 って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場
 合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のか すれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意 識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を
 中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販
 売者に相談してください。

2401-AHI