

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

温感シップ剤 **サンポーシップホット** 第3類医薬品

【特徴】

- **サンポーシップホット**は、鎮痛・消炎効果と温感作用をあわせもった温感シップ剤です。
- **サンポーシップホット**は、鎮痛・消炎成分、血行促進成分、心地よい温感刺激付与成分などの働きで、肩こり、腰痛、関節痛などによく効きます。
- ひじやひざなどの屈伸部への固定に、便利な粘着シートが入っています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を必ず守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 打撲(うちま)、捻挫(ひねり)、はれがひいてから使用してください。

(4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

(5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(6) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないでください。(強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は、30分位してから使用してください。)

(7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。

(8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】 本品膏体100g(875cm²) 中

サリチル酸メチル	1.5g
l-メントール	0.5g
dl-カンフル	0.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.3g
グリチルレチン酸	0.05g
オウバク軟エキス(原生薬換算量3.3g)	1.0g
トウガラシエキス(原生薬換算量3.75g)	0.3g
添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、エデト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有する。		

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 12枚入(1枚サイズ：14cm×10cm)

—— お問い合わせ先 ——

三宝製薬株式会社 お客様相談室
電話 (03) 3952-0100
月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

613N



発売元
三宝製薬株式会社

東京都新宿区下落合2丁目3番18号

製造販売元



帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地



4 961248 002507



ここを押して
開けてください。