

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

●肩こり、筋肉痛、うちみ等に 第3類医薬品

ニューホルキス〈クール〉

- ニューホルキス〈クール〉は、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった冷感パップ剤です。
- ニューホルキス〈クール〉は、6種の有効成分（サリチル酸グリコール、*l*-メントール、*dl*-カンフル、トコフェロール酢酸エステル、ジフェンヒドラミン塩酸塩、グリチルレチン酸）の働きで、肩こり、筋肉痛、うちみ等によく効きます。
- ニューホルキス〈クール〉は、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の部位には使用しないこと

（1）目の周囲、粘膜等。（2）湿疹、かぶれ、傷口。

 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

打撲、捻挫、肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）用法・用量を厳守すること。
- （2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- （3）汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- （4）皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
（使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。）

【成分・分量】 本品膏体100g（875cm²）中

サリチル酸グリコール…… 1.5g トコフェロール酢酸エステル…… 0.3g
l-メントール …………… 0.5g ジフェンヒドラミン塩酸塩…… 0.1g
dl-カンフル …………… 0.5g グリチルレチン酸 …………… 0.05g
添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、尿素、エドト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】10枚入 [5枚入×2袋]（1枚サイズ：14cm×10cm）

発売元

テイコクファルマケア株式会社

香川県東かがわ市三本松567

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電 話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

肌を押しこんで開けてください。

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

