

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

うちみ・ねんざ・筋肉痛に

新ノイガンハップ^{ワール}

冷たい貼りごこち

特徴

新ノイガンハップクールは、生薬を配合した冷たい貼りごこの消炎・鎮痛パップ剤です。消炎・鎮痛成分と3種の生薬(オウバク、サンシシ、サンショウ)エキスが、はれ、熱感などの急性炎症を伴う、うちみ、ねんざ、筋肉痛などに効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱(又は袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱(又は袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、腰痛、肩こり、しもやけ

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

第3類医薬品

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (3)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

成分・分量 膏体100 g (1,000cm²) 中

サリチル酸グリコール ……2.0 g l-メントール ……1.0 g
d-カンフル ……0.5 g トコフェロール酢酸エステル ……0.3 g
グリチルリチン酸 ……0.03 g
オウバク軟エキス ……0.7 g (原生薬として 2.31 g)
サンシシ軟エキス ……0.33 g (原生薬として 1.0 g)
サンショウ軟エキス ……0.3 g (原生薬として 1.0 g)
添加物として、ゼラチン、カルメロースNa、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、ポリソルベート80、尿素、エデト酸Na、カオリין、pH調整剤、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんとしめて外気にふれないようにしてください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】15枚入 (1枚:14cm×10cm、14 g)

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

【販売名】新ノイガンハップクール

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
http://www.wakunaga.co.jp/

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

押してあける

