

HapYcom  
ハピコム

セルフメディケーション

税 控除 対象

# スキュータムA

ハーコサイズ

**4**種<sup>\*</sup>の  
有効成分

冷感

ねんざ  
打撲  
筋肉痛

鎮痛・消炎パップ剤

全方向  
伸縮自在

1枚サイズ 10cm×7cm

第3類医薬品

※サリチル酸グリコール/ℓ-メントール/グリチルリチン酸/アルニカチンキ



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

鎮痛・消炎パッチ剤 Pain Relief Gel Patch

販売名: スキュータムA

# スクュータムA 冷感 ハーフサイズ



ねんざ 打撲 筋肉痛

## 特徴

- スキュータムAは、鎮痛・消炎効果と冷シブ作用をあわせもった鎮痛・消炎パッチ剤です。
- スキュータムAは、4種の有効成分(サリチル酸グリコール、*l*-メントール、グリチルリチン酸、アルニカチンキ)の働きで、筋肉痛、打撲、捻挫等によく効きます。
- スキュータムAは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

## 用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

## 成分・分量 膏体100g(875cm<sup>2</sup>)中

サリチル酸グリコール	1.0g
<i>l</i> -メントール	0.5g
グリチルリチン酸	0.03g
アルニカチンキ	1.0mL(原生薬換算量 0.2g)

添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、エデト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調節剤、その他4成分を含有する。

7cm

原寸大

10cm

開  
け  
口

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話(0879)25-2363  
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN