

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮痛消炎パップ剤 **温感タイプ**

第2類医薬品

LION

ハリックス55 ID温感H

微香性

腰・肩の痛みに優れた効果を発揮し、心地よい温熱感が持続します

1. インドメタシンが浸透し、腰、肩、関節の痛みのもとを直接的に鎮めます。
2. トウガラシエキスが患部の血流を改善して痛みやコリをやわらげます。
3. 肌にやさしい弱酸性・高含水基剤(PAC-55)を採用。
においが気にならない微香性です。
4. 身体の動きにピタリと密着する高伸縮性ニット支持体を採用。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
[以前お薬を使用してアレルギー症状を起こしたことがある人は、再び同じお薬を使用すると更に強い症状を起こす可能性があります。]
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。[ぜんそくのある人がインドメタシン等の抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがあります。]
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、筋肉痛、打撲、捻挫(ねんざ)、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量 プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 11才未満の小児に使用させないでください。
- (4) 痛みやはれ等の症状がある場合だけ使用してください(本剤は痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であり、原因となっている病気を治療するものではありません)。
- (5) 汗をかいたり、患部がぬれているときはよく拭きとってからお貼りください。
- (6) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (7) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (8) 打撲、ねんざには、はれがひいてから使用してください。
- (9) 本剤を使用してから汗をかくと刺激を感じことがあります。
- (10) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。
- (11) 貼ったまま、あるいははがした直後に入浴すると刺激を感じことがあります。少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分位してからお貼りください。
- (12) 連続して2週間以上使用しないでください。

成分 膜体100g(1000cm²)中

有効成分	分量	はたらき
インドメタシン	0.375g	炎症、痛みをおさえます。
トウガラシエキス*	0.02g(原生薬換算量1.0g)	血流を改善します。

*トウガラシを精製し、50倍に濃縮したものです。

添加物として、プロピレンジコール、マクロゴール、CMC-Na、グリセリン、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、ヒマシ油、ラウロマクロゴール、エデト酸Na、ヒドロタルサイト、パラベン、ペントナイト、酸化チタン、香料を含有。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り上げて外気にふれないようにしてください。
- (5) 使用期限(箱、袋に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問合せ先

お問い合わせのお店又は下記にお問合せください。

ライオン株式会社 お客様センター

電話:0120-813-752 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

0213

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931
(ANALGESIC & ANTI-INFLAMMATORY CATALYST)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7