

虫さされ、かゆみにホルキスパッチ

第2類医薬品

使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

虫さされ、かゆみに

第2類医薬品

ホルキスパッチ

【特徴】ホルキスパッチは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

△使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨️ **相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、色素沈着

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 外用にのみ使用すること。
- 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
- 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】1m²(膏体100g)中

クロタミトン 5.0g リドカイン 2.0g
ジフェンヒドラミン 1.0g イソプロピルメチルフェノール 1.0g
添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスポリイソブレンゴム、BHTを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】40枚入(20枚×2袋)(直径3cmの円形)

<お問い合わせ先>

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00~17:00

(土・日・祝日を除く)



ここを押し
開けて下
さい

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567