

虫さされかゆみに ケアルラパッチ かゆみ止めパッチ

第2類医薬品

使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

【特徴】

●ケアルラパッチは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

△使用上の注意

⊗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、色素沈着

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 外用にのみ使用すること。

- 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
- 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】膏体100g中

クロタミトン・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.0g

リドカイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.0g

ジフェンヒドラミン・・・・・・・・・・・・・・1.0g

イソプロピルメチルフェノール・・・・・・・・・・1.0g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイスポリイソプレンゴム、BHTを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管すること。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

(直径3cmの円形)

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話(0879)25-2363

受付時間

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

販売名 ケアルラパッチ

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

第2類医薬品

貼る

第2類医薬品

虫さされ・
かゆみに

かゆみ止め

かきむしり防止

ケアルラパッチ



かゆみ止め成分配合

- ジフェンヒドラミン
- クロタミトン

肌色無地で
目立たない!

原寸大(直径30mm)

使用に際してこの説明文書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

ここを押して開けて下さい

【特徴】


ケアルラパッチは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

△使用上の注意

⊗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



■相談すること

- 次の人は使用前に医師 薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、色素沈着

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【**効能・効果**】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【**用法・用量**】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

〈**用法・用量に関連する注意**〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 外用にのみ使用すること。
- 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
- 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【**成分・分量**】膏体 100g 中

クロタミトン 5.0g ジフェンヒドラミン 1.0g
リドカイン 2.0g イソプロピルメチルフェノール 1.0g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスポリイソプレンゴム、BHTを含む。

【**保管及び取扱い上の注意**】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
(直径3cmの円形)

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話(0879)25-2363

受付時間

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

販売名

ケアルラパッチ

第2類医薬品

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

