

虫さされ、かゆみに パラモスパッチ

使用に際してこの説明書をよく読むこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

虫さされ、かゆみに 第2類医薬品 パラモスパッチ

特徴

パラモスパッチは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、色素沈着

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
- (5) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】1m²(膏体100g)中

クロタミトン	5.0g	リドカイン	2.0g
ジフェンヒドラミン	1.0g	イソプロピルメチルフェノール	1.0g
添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスピリインプレンゴム、BHTを含む。			

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】40枚入(20枚×2袋)(直径3cmの円形)

こ
こ
開
け
て
下
さ
い
て



副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

お問い合わせ先
本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567