

生薬成分入り

御岳山



冷感

百草シツプⅡ

セルフメディケーション
税控除対象

第3類医薬品



腰痛・肩こり
筋肉痛・打撲に

3種の生薬成分配合



長野県製薬株式会社

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

成分・分量

膏体100g(875cm²)中

サリチル酸グリコール ……1.0g l-メントール ……1.0g
dl-カンフル ……0.5g トコフェロール酢酸エステル ……0.3g
オウバク軟エキス ……0.3g (原生薬換算量 1.0g)
サンシシ軟エキス ……0.167g (原生薬換算量 0.5g)
アルニカチンキ ……0.5mL (原生薬換算量 0.1g)

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、尿素、エデト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

1枚サイズ:10cm×14cm

販売名: 百草シップII

発売元

長野県製薬株式会社

長野県木曾郡王滝村此の島100-1
お問い合わせ先: お客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-100-975

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

ここを押して
開けて下さい。