

腰痛・肩の痛み*・関節痛



フェルビナク70 mg 配合

オムニードフェルビナク温感

第2類医薬品

微香性

つらい痛みに

直接作用

温感


腰痛



肩の痛み*



関節痛



貼りやすい分割ライナー採用

貼付方法
(例)



特徴

- オムニードフェルビナク温感は、痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮めるフェルビナクと患部に心地よい温感刺激を与えるトウガラシエキスを配合した鎮痛・消炎パップ剤です。
- オムニードフェルビナク温感は、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。

*肩こりに伴う肩の痛み

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

オムニードフェルビナク温感

第2類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は使用しないでください。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4)15歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 3. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、痛み、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘等)、打撲、捻挫

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

●15歳未満の小児は使用しないでください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)打撲(打ち身)、捻挫に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用してください。
- (6)本剤を使用してから汗をかくと強い刺激を感じことがあります。
- (7)本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。
- (8)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (9)本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。(強い刺激を感じことがあるので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分程度から使用してください。)

【成分・分量】 膜体100g中

フェルビナク……0.5g

トウガラシエキス……0.1g(原生薬換算量1.25g)

添加物として、ジイソプロパノールアミン、L-メントール、カルボキシビニルポリマー、酸化チタン、カオリン、パラベン、エデト酸Na、D-ソルビトール、プロピレングリコール、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、グリセリン、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。

【包装】

(1枚サイズ:14cm×10cm)

発売元

ティコクフルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

セルフメディケーション

税控除対象

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ここを
押して
ください。