

ご使用にあたって、次の説明を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう保管してください。

第3類医薬品

# 生薬エキスの中京パップ剤

爽快な香りの冷感タイプ  
販売名：フリーティア

## <フリーティアの特徴>

フリーティアには、3種類の生薬のエキス(オウバク、サンシシ)・チンキ(アルニカ)とサリチル酸グリコール、*l*-メントール、*dl*-カンフル、トコフェロール酢酸エステル等の計7種類の有効成分を配合していますので、すぐれた鎮痛消炎効果を発揮します。

## △使用上の注意

**×してはいけないこと** 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

## ●相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

<発売元>

 株式会社 **中京医薬品**  
愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

<製造販売元>

**帝國製薬株式会社**  
香川県東かがわ市三本松567番地

(お問い合わせ先)  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話 (0879)25-2363  
受付時間 9:00～17:00  
(土・日・祝日を除く)

セルフメディケーション

税 控除 対象

## 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

## 【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。  
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。  
(4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】膏体100g(875cm<sup>2</sup>)中

サリチル酸グリコール……………1.0g *l*-メントール……………1.0g  
*dl*-カンフル……………0.5g トコフェロール酢酸エステル……………0.3g  
オウバク軟エキス……………0.3g(原生薬換算量 1.0g)  
サンシシ軟エキス……………0.167g(原生薬換算量 0.5g)  
アルニカチンキ……………0.5mL(原生薬換算量 0.1g)

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸 Na、尿素、エド酸 Na、カオリン、酸化チタン、pH 調節剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて保管してください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)  
(4)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】7枚入(1枚サイズ：8×12cm)

本品は生薬(オウバク・サンシシ)エキスを配合していますので、製品により色調が多少異なることがありますが、品質には変わりありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

0205

価格 ¥748(10%税込) [本体価格 ¥680]



世界の子供たちに健康と教育を

国際貢献活動を支援します

この商品の売り上げの一部は「きずなASSIST基金」に寄付されます。

製造番号

配置期限  
(西暦年月)

