

# エルペナEG

10枚入(1枚:7cm×10cm)

<お問い合わせ先> 帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話(0879)25-2363 受付時間 9:00~17:00  
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

肩こり・腰痛などに  
**エルペナEG**

第3類医薬品

## 【特徴】

- エルペナEGは、鎮痛・消炎作用を有するサリチル酸グリコール、/-メントールに、患部の血行を良くするトコフェロール酢酸エステル、ノニル酸ワニリルアミドを配合した、肩こり、腰痛などにすぐれた効きめをあらわすテープ剤です。
- エルペナEGは、粘着性にすぐれています、関節部位にもピッタリフィットします。

## △使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製造番号

使用期限  
(西暦年月)



発 売 元 テイコクファルマケア株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元 帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

【効能・効果】腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しみやけ

【用法・用量】ライナー(はくり紙)をはがし、1日1~2回患部に貼付する。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 打撲(しみ)、捻挫には、はがひいてから使用すること。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取つてから使用すること。
- (5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (6) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないこと。  
(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分位してから使用すること。)
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。  
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】本品1m<sup>2</sup>(膏体100g)中

サリチル酸グリコール……………8.0g  
/-メントール……………5.0g  
トコフェロール酢酸エステル……………0.5g  
ノニル酸ワニリルアミド……………0.01g  
添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、BHTを含有する。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。