

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ここを押して  
開けてください。

# オムニードFBプラスターα

第2類医薬品

## 【特徴】

- オムニードFBプラスターαは鎮痛成分フェルビナクを5.0%配合した鎮痛・消炎テープ剤です。
- オムニードFBプラスターαはビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)が末梢の血流を促進し、更に、l-メントールの働きで心地よい冷感刺激があり、痛みをやわらげます。
- オムニードFBプラスターαは目立ちにくい肌色の基布を使用しています。



## 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

### ▢ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水泡

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話 (0879) 25-2363  
受付時間 9:00~17:00  
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



セルフメディケーション  
税控除対象

製造販売元

帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地



4 987373 074684

40枚入(8枚×5袋) 1枚サイズ: 7cm×10cm