



かゆみ、虫さされに

目立たない!

臭わない!

かゆい
ところに貼るだけ!

かきむしり防止



かゆみ止めパッチS

セルフメディケーション

税 控除 対象

第2類医薬品



使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

【特徴】

- かゆみ止めパッチSは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

- (4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。
- (5) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】膏体100g中

ジフェンヒドラミン・・・・・・・・・・1.0g
リドカイン・・・・・・・・・・2.0g
イソプロピルメチルフェノール・・・・・・・・1.0g
サリチル酸グリコール・・・・・・・・1.0g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、BHT、流動パラフィン、その他2成分を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管すること。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】

直径25mmの円形

＜お問い合わせ先＞

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記に
お願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話(0879)25-2363
受付時間
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

販売名 かゆみ止めパッチS

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

ここを押して
開けて下さい

第2類医薬品