

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

腰痛・関節痛・肩こり

消炎鎮痛

温感パップS

第3類医薬品

【特徴】

- 消炎鎮痛温感パップSは、消炎鎮痛効果と温感作用をあわせもったパップ剤です。
- 消炎鎮痛温感パップSは、サリチル酸グリコール、*l*-メントール等の消炎鎮痛成分にトウガラシエキスを配合していますので、心地よい温感で、腰痛、関節痛、肩こりなどによく効きます。
- 消炎鎮痛温感パップSは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗣️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用すること。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (6) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないこと。
(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は30分程してから使用すること。)
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】 膏体100g(1000cm²)中

サリチル酸グリコール……0.5g トウガラシエキス………0.3g
l-メントール………0.2g (原生薬換算量3.75g)
dl-カンフル………0.3g
 添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、プロピレングリコール、尿素、エデト酸Na、カオリン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

〈販売名〉 消炎鎮痛温感パップS

〈包装〉 30枚入 [6枚入×5袋] (1枚サイズ:10cm×14cm)

〈お問い合わせ先〉
 本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
 帝國製薬株式会社 お客様相談室
 電話 (0879)25-2363
 受付時間 9:00～17:00
 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



製造販売元
 帝國製薬株式会社
 香川県東かがわ市三本松567番地

