

〈切り取り線〉



チャック ご使用後はチャックをきちんと閉めて保管してください。

開封後はなるべく早くご使用ください。

日本薬局方 フェルビナクパップ
ティパップFB

7枚入
(1枚サイズ:10×14cm)

ご使用に際して、裏面の説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【特徴】

- ティパップFBは、有効成分（フェルビナク）が痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎フェルビナクパップ剤です。
- ティパップFBは、粘着性に優れた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。
- ティパップFBは、基剤中の水分により、打撲、捻挫等による熱を持った患部を心地よく冷却します。

〈お問い合わせ先〉

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879)25-2363
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品

発売元
テイコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地
製造販売元
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地





⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

●15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】 膏体100g中 フェルビナク …………… 0.5g

添加物として、L-メントール、ジイソプロパノールアミン、カルボキシビニルポリマー、酸化チタン、カオリン、エデト酸Na、D-ソルビトール、プロピレングリコール、クロタミトン、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、グリセリン、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。また、未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。

製造番号

使用期限
(西暦年月)