

インドメタシン3.75%配合

ティプラースターID

外用消炎鎮痛テープ剤

ご使用に際して、裏面に記載の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

- ティプラースターIDは、有効成分インドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める消炎鎮痛インドメタシン配合テープ剤です。
- ティプラースターIDは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、関節部位にもピッタリフィットします。

発売元

ティコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

〈お問い合わせ先〉

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879)25-2363
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品

10枚入
(7×10cm)

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

- 11歳未満の小児は使用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 11歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。
- (6) 皮膚の特に弱い人は、本剤を同じ箇所には続けて貼らないこと。
- (7) 連続して2週間以上使用しないこと。

【成分・分量】膏体100g(1m²)中

インドメタシン 3.75g

添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、BHT、1-メントール、香料、流動パラフィン、その他1成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】10枚入り(1枚:7×10cm)

製造番号

使用期限
(西暦年月)

